



**Variedad  
SE-45**


**PRIMUS VISION S.A. DE C.V.**

TEL. (33) 4444 0101 Y (33) 4444 0100 GUADALAJARA, JALISCO [www.primusvision.mx](http://www.primusvision.mx)  
DIAGRAMA TÉCNICO DE LABORES NECESARIAS PARA LA SIEMBRA Y CULTIVO DE LA VARIEDAD  
SE-01 DE SÚPER SORGO (SS) PARA REGIONES CON AL MENOS 650 mm DE LLUVIA ANUAL

**CICLO OTOÑO - INVIERNO  
PARA TROPICO**



**PrimusVISION**  
Distribuidor MASTER



1.- "Curado" de la semilla: Aplicar 6 gr/Kg para proteger el cultivo (Pulgón amarillo) recubriendo la semilla con insecticida que contenga i.a : Bifentrina + Imidacloprid. ej: (Allectus 722 TS, contiene 120 gr)

2.- Control de plagas del suelo: Aplicar 20-25 kg en banda en aplicación total de insecticida granulado que contenga i.a: Clorpirifos etil 5%. ej: (Lorsban 5G)

\*Fertilización a la siembra: Mezclar 125 kg de Urea+ 175 kg DAP + 125 kg Cloruro de Potasio/ha.

o Mezclar 125 kg de Urea+ 125 kg MAP + 125 kg Cloruro de Potasio/ha.

\*\*"Sellado" del suelo: Aplicar 3- 4 lt/ha de herbicida que contenga: Atrazina + Terbutrina (se requiere que exista humedad en el suelo). ej: (Gesaprim Combi 500 FW)

3.- Preventivo para plagas en follaje: Aplicar 250 ml/ha de insecticida que contenga: Bifentrina + imidacloprid (No esperar a que se presenten plagas en el follaje). ej: (Allectus 300 SC, contiene 250 ml).

\* Control de maleza de hoja ancha: Aplicar 1.5 a 2.0 lt/ha de herbicida que contenga: ácido 2,4-D (Se requiere que exista humedad en el suelo). ej: (Hierbamina)

\* Segunda dosis de fertilización: Aplicar en banda 100 kg de urea/ha.

4.- Preventivo para plagas en follaje: Aplicar 250 ml/ha de insecticida que contenga: Bifentrina + Imidacloprid (No esperar a que se presenten plagas en el follaje). ej: (Allectus 300 SC, contiene 250 ml)

5.- La variedad SE-45, cosecharla a los 55-65 días dependiendo de las condiciones climáticas de cada lugar o en aparición de hoja bandera.

NOTA: Después de cosecha aplicar 100 kg de Urea por ha de fertilización, aplicar los preventivos de plagas a los mismos días del primer corte, estar atento a la aparición de la hoja bandera para cosechar. repetir este paso para el tercer corte si es que lo hay.